Neutropene koorts

Hemodynamisch stabiel
Verdacht voor koorts van andere origine
Geen zuurstofnood
Geen verdenking pneumonie

Penicilline allergie:
Dag 1:
zie beleid bij vaste tumoren laag risico (peni allergie)
+
Vancomycine oplaad volgens gewicht

Vanaf dag 2:
zie beleid bij vaste tumoren laag risico (peni allergie)
+
Vancomycine continu infuus volgens gewicht

Dag 1:
Piperacilline/tazobactam 4 x 4 g/d
+
Amikacine oplaad volgens gewicht
STOP ciprofloxacine profylaxe

Dag 2-3:
Piperacilline/tazobactam 4 x 4 g/d
+
Amikacine vervolgdosis volgens gewicht

Vanaf dag 4:
STOP Amikacine tenzij microbiologisch gedocumenteerde contra-indicatie

Dreigende shock
Kritisch zieke patiënt,
Zuurstofnood of
verdenking pneumonie

Dag 1:
Meropenem 1 g
3x/d
STOP ciprofloxacine
profylaxe

CVC als focus OF
Ernstige mucositis OF
Huid/weke delenfocus OF
Septische shock

TOEVOEGEN
vancomycine oplaad +
vervolgdosis in continu
infuus volgens gewicht

Dag 4:
zo geen resistente microbiologisch gedocumenteerde infectie STOP

ZIEKENHUIS aan de STROOM

Versie april 2026



ZIEKENHUIS aan de STROOM

Versie april 2026