

Dosisaanpassing Vancomycine volgens spiegelbepaling bij intermitterend infuus (en bij normale nierfunctie):

Oplaaddosis 35 mg/kg (max 3g) in 500 ml glucose 5% (of NaCl 0,9%) over 4 uur

Onderhoudsdosis 15 mg/kg om de 12uur te starten 12 uur na oplaaddosis
in 250-500 ml glucose 5% (of NaCl 0,9%) over 2 uur

Vlak voor 4e toediening:
Bepaling vancomycine dalspiegel (doel 15 – 20 mg/l)

<15 mg/L

15-20 mg/L

20-25 mg/L

>25 mg/L

Onderhoudsdosis verhogen
met 250 mg/12 uur

Onderhoudsdosis ongewijzigd

Onderhoudsdosis verminderen
met 250 mg/12 uur

Spiegel correct afgenomen?
Zo ja: Sla 1 gift vancomycine over.
Spiegelen vlak voor de volgende gift en
met die toediening wachten tot de spiegel
gekend is. Pas terug starten aan
gereduceerde dosis als spiegel \leq 20

Bepaling vancomycine dalspiegel vlak voor 4e toediening nieuwe dosis.
Eventueel opnieuw aanpassen volgens bovenstaand schema.