

Geen of onzekere vaccinatie

Onvolledige
primovaccinatie

Volledige primovaccinatie

Laatste vaccinatie <5 jaar
geleden

Laatste vaccinatie >5 jaar en
<10 jaar geleden

Laatste vaccinatie >10 jaar en
< 20 jaar geleden

Laatste vaccinatie >20 jaar
geleden

Oppervlakkige en schone wonde

Volledige primovaccinatie

Vaccinatieschema afwerken

Geen actie

Geen actie

Boostrix (1 dosis)

Boostrix (2 dosissen met 6
maand interval)

Wonde met risico op tetanus*

Volledige primovaccinatie en
specifieke IG**

Vaccinatieschema afwerken
en specifieke IG**

Geen actie

Boostrix (1 dosis)

Boostrix (1 dosis) en
specifieke IG**

Boostrix (2 dosissen met 6
maand interval) en
specifieke IG**

* kneus- of verbrijzelwonden, bijtwonden, prikwonden door houtsplinters of doornen of wonden die met aarde of dierlijke uitwerpselen werden bevuld en wonden die niet binnen de 6u verzorgd werden

Tetagam 250 IE/ml. Voor volwassenen en kinderen bedraagt de **profylactische dosis 250-500 IE éénmalig. Indien vaccin en IG tegelijk worden toegediend dient het vaccin in de arm en de IG in de bil worden ingespoten met verschillende spuit-naald om neutralisatie te voorkomen. De **therapeutische** dosis bedraagt 500 IE/ml voor neonaten en 3000 IE/ml voor kinderen maar hogere dosissen zijn mogelijk iom kinderinfectioloog. Voor volwassenen bedraagt dit 6000 IE/ml.