Flowchart ZAS Cefalosporine beleid

De patiënt heeft een penicilline allergie label in het dossier.

→ Correcte anamnese afnemen.
Gebruik de HIX/EPD vragenlijst in de allergie module.

→ Heeft de indexreactie op penicilline kenmerken van SCAR/ernstige type IV uitstelde hypersensitiviteit?
m.n. huidafwijkingen over grote delen van het lichaam, blaarvorming of brandwondenachtig aspect, aantasting mond/mucosa of majeure orgaan aantasting – Meestal ontstaan enkele dagen tot weken na inname?

JA

CONTRA-INDICATIE
voor alle BETA-LACTAMs
= alle penicillines en cefalosporines
incl. cefazoline kies een alternatief AB

NEE

en ik wil cefazoline toedienen

gebruik van CEFAZOLINE toegestaan

en ik wil 2-5e generatie cefalosporines toedienen
m.n. cefuroxim, ceftriaxone, ceftazidim, cefepim

Heeft de indexreactie op penicilline kenmerken van ernstige IgE gemedieerde allergie/anafylaxie?
m.n. anafylaxie met articaria, angio-oedeem, bronchospasme en/of hyptensie met verloop over minuten-uren. Gebruik de HIX/EPD vragenlijst in de allergie module.

score = 0 GROEN	score 1-2 ORANJE	Score ≥ 3 ROOD
MAG PENICILLINE KRIJGEN **GEBRUIK van 2-5e generatie CEFALOSPORINES is TOEGESTAAN** incl. meropnemen en monobactams Betreft hier vermoedelijk een bijwerking van penicilline gelieve allergielabel aan te passen en te verwijderen uit dossier.	VOLG ADVIES HIX tool m.b.t. penicilline **GEBRUIK van 2-5e generatie CEFALOSPORINES is TOEGESTAAN** incl. meropnemen en monobactams	**MAG GEEN PENICILLINE KRIJGEN** **GEBRUIK van 2-5e generatie CEFALOSPORINES is TOEGESTAAN MITS 2-staps toediening** 10% van een dosis + 30 min observatie gevolgd door 90% van een dosis + 1 uur observatie kan ingevoerd worden via VCMO HIX. Meropnemen en monobactams mogen wel toegediend worden.

ZIEKENHUIS aan de STROOM

Versie april 2026