

Geen of onzekere vaccinatie

Onvolledige primovaccinatie

Volledige primovaccinatie

Laatste vaccinatie <5 jaar geleden

Laatste vaccinatie >5 jaar en <10 jaar geleden

Laatste vaccinatie >10 jaar en <20 jaar geleden

Laatste vaccinatie >20 jaar geleden

Oppervlakkige en schone wonde

Volledige primovaccinatie

Vaccinatieschema afwerken

Geen actie

Geen actie

Boostrix (1 dosis)

Boostrix (2 dosissen met 6 maand interval)

Wonde met risico op tetanus*

Volledige primovaccinatie en specifieke IG**

Vaccinatieschema afwerken en specifieke IG**

Geen actie

Boostrix (1 dosis)

Boostrix (1 dosis) en specifieke IG**

Boostrix (2 dosissen met 6 maand interval) en specifieke IG**

* kneus- of verbrijzelwonden, bijwonden, prikwonden door houtsplinters of doornen of wonden die met aarde of dierlijke uitwerpselen werden bevuld en wonden die niet binnen de 6u verzorgd werden

**Tetagam 250 IE/ml. Voor volwassenen bedraagt de dosis 250-500 IE éénmalig. Indien vaccin en IG tegelijk worden toegediend dient het vaccin in de arm en de IG in de bil worden ingespoten met verschillende spuit-naald om neutralisatie te voorkomen.