

1^e lijnsbehandeling

Empirische behandeling

P + Tryplera ged. 10 dg
of
PAMC ged. 14 dg
(cave hoge C resistentie in onze setting)

2^e lijnsbehandeling

ander schema dan 1^e lijn
PAMC ged. 14dg
of
P + Tryplera ged. 10 dg

Behandeling obv gevoeligheidsbepaling

2 gevoelige AB ged. 14 dg

Clarythromycine gebaseerd schema
heeft voorkeur:

- PAC ged. 14 dg
- PMC ged. 14 dg (bij peni allergie)

Indien MR: geef metronidazole HD

Indien CR: P + Tryplera ged. 10 dg

Indien CR + TR en LS: PAL ged. 14 dg

Refractaire ziekte

Check compliance en voer nieuwe gevoeligheidsbepaling uit.

Indien LS: high dose PAL ged. 14 dg

Indien LR + CS + AS: high dose PAMC ged. 14 dg

Indien LR + (AR of CR): P + Tryplera ged. 14 dg

Tryplera = tetracycline + amoxicilline + bismut, **P** = PPI (esomeprazole of rabeprazole), **A** = amoxicilline, **M** = metronidazole, **C** = clarythromycine, **L** = levofloxacin, **T** = tetracycline, **R** = resistent, **S** = gevoelig, **SD** = standard dose, **HD** = high dose

amoxicilline 1g 2x/d (SD) of 4x/d (HD), **metronidazole** 500 mg 3x/d (SD) of 4x/d (HD), **clarythromycine** 500 mg 2x/d (SD=HD),
levofloxacin 500 mg 1x/d (SD) of 2x/d (HD), **esomeprazole** 40 mg 2x/d (steeds HD), **rabeprazole** 20 mg 2x/d (steeds HD)